

フルティフォーム125エアゾール

【適応】 気管支喘息

用意するもの	・吸入練習用 ・フルティフォーム用吸入トレーナー(音が鳴る)
--------	-----------------------------------

吸入操作(指導箋を使用)

項目	再指導必要
①押しボタンが上になるよう容器を持つ	
②吸入器をよく振る	
③吸入前に苦しくならない程度に息を吐き出す	
④吸入口を軽く歯でくわえる(口角に少し隙間を作る)	
⑤ゆっくり深く吸入する	
⑥口を閉じて約5秒の息止めをする(苦しくない程度)	
⑦ゆっくり息を吐き出す	
⑧吸入口を拭き、カバーを閉じる	
⑨吸入後はうがいをする(副作用予防)	

ポイント

- ・主薬と噴霧ガスを均一にするため、噴霧前に容器を十分に振る必要あり
- ・吸入の同調を確認する
吸入時に「同調できない」「刺激でむせる」などの場合にはスパーサー使用を考慮

※小児に適応があるのは、フルティフォーム50エアゾール(非採用)

薬剤名 : フルティフォーム

指導対象: 本人 家族 その他()

確認事項:

ミニリンメルトOD錠25μgまたは50μg(男性における夜間多尿による夜間頻尿)をを投与中の患者は禁忌(無水アルコールをごく少量含有しているため、アルコール過敏について患者さまより申し出があれば医師に確認)

吸入介助: 不要 必要(介助者)

補助具 : フルプッシュ 不要 必要

スパーサー 不要 必要 ※メーカーからの無償提供無し

再指導 : 不要 必要

申し送り:

以下、内容を説明実施

【用法用量】 1日2回 1回2~4吸入

【薬識】 調子のよいときだけ使うものではなく、毎日吸入することで症状の悪化を防ぐ

【薬効】

- ・気道の炎症や腫れを抑える
- ・気道を広げ、呼吸を楽にする

【主な副作用】

- ・口腔内カンジダ、嘔声
- ・動悸、頻脈、振戦など

【その他注意事項など】

- ・空うちは、初めて使用する前、3日以上使用していない場合に4回行う
- ・週1回以上アダプターの吸入口の外側と内側を乾いた布やティッシュペーパーでよく拭く
- ・開封後3ヶ月以内に使用する
- ・高温多湿を避け、室温で保管