

スピリーバ2.5 μ g レスピマツト スピオルト レスピマツト

【適応】 スピリーバ:気管支喘息 COPD
スピオルト:COPD

用意するもの	<ul style="list-style-type: none"> ・レスピマツト操作確認用キット ・吸気速度笛 ・必要に応じて拡大コピーした説明用紙(透明ファイルに有り)
--------	--

吸入操作(指導箋を使用)

項目	再指導必要
①キャップを閉じた状態で本体を上向きに持つ	
②カチッと音がするまで、透明ケースを180度回転させる	
③キャップを開ける	
④吸入前に苦しならない程度に息を吐き出す	
⑤吸入口を舌の上にのせてしっかりとくわえる(口元は隙間がないように)	
⑥ゆっくり息を吸いながら噴霧ボタンを押す	
⑦口を閉じて約5秒の息止めをする(苦しならない程度)	
⑧ゆっくり息を吐き出す	
⑨吸入口を拭き、カバーを閉じる	
⑩吸入後はうがいをする(副作用予防)	

ポイント

- ・吸入の同調を確認する(噴霧は約1.5秒)
- ・吸入ステロイド以外の吸入薬も手技の統一化をはかるため、うがいを行うよう指導する

薬剤名 :
 指導対象: 本人 家族 その他()
 確認事項: 閉塞隅角緑内障の患者・前立腺肥大等による排尿障害のある患者は禁忌
 吸気速度笛で音が鳴ることを確認
 吸入介助: 不要 必要(介助者)
 補助具 : 回転君 不要 必要
 再指導 : 不要 必要
 申し送り :

以下、内容を説明実施

【用法用量】 1日1回 1回2吸入

【薬識】 調子のよいときだけ使うものではなく、毎日吸入することで症状の悪化を防ぐ

【薬効】 気道を広げ、呼吸を楽にする。

【主な副作用】

- ・動悸、頻脈、振戦など ※スピオルトのみ
- ・抗コリン性症状(口渇、目の痛み(眼圧上昇による緑内障発作)、排尿障害など)

【その他注意事項など】

- ・吸入を忘れた場合、気がついた時点で1回分を吸入 1日1回を超えない
- ・カートリッジ挿入後、3ヶ月以上たった薬剤は使用しないこと
- ・初回の空うちは4回 1週間以上使用していない場合、空うちを1回行う
- ・毎日(少なくとも週1)マウスピースとその内側の金属部分をティッシュペーパーなどで拭く
- ・高温多湿を避け、室温で保管